



Paxlovid-lääkehoidon kohderyhmät

Huomioi, että aiemmin sairastetun covid-19-infektion katsotaan vastaavaan yhtä rokoteannosta.

Kohderyhmä 1

Erittäin altistavan riskiryhmän yli 18-vuotias potilas riippumatta saaduista rokotuksista

- elin- tai kantasolusiirto 6 kk:n sisällä tai edelleen jatkuva voimakas hylkimisenestolääkitys
- aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti (voimakkaasti immuunijärjestelmää heikentävä syöpä tai hoito)
- vaikeat puolustusjärjestelmän häiriöt

Kohderyhmä 2

Erittäin altistavan riskiryhmän yli 18-vuotias potilas, mikäli potilas on rokottamaton tai saanut vain yhden rokoteannoksen,

- vaikea krooninen munuaissairaus
- vaikea krooninen keuhkosairaus
- lääkehoitoinen tyyppin 2 diabetes
- Downin oireyhtymä

Kohderyhmä 3

Altistavan riskiryhmän yli 40-vuotias potilas, mikäli potilas on rokottamaton tai saanut vain yhden rokoteannoksen.

- jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
- vaikea sydänsairaus
- hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
- immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
- vaikea krooninen maksasairaus
- tyyppin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
- vaikea tai keskivaikea uniapnea
- sairaaloinen lihavuus BMI>40 (voidaan harkita myös rokottamattomille alle 40-vuotiaille)

Kohderyhmä 4

Omatoimisesti kotona asuva yli 80-vuotias potilas, mikäli hän on saanut alle 4 rokoteannosta.